

Journal für Kardiologie

Austrian Journal of Cardiology

Österreichische Zeitschrift für Herz-Kreislauserkrankungen

Klinischer Stellenwert und Indikationen zur Magnetresonanztomographie des Herzens 2013: Ein interdisziplinäres Expertenstatement

Globits S, Loewe C, Schuchlenz H

Kaiser B, Fiegl N, Artmann A

Hawlich K, Newrkla S, Gessner M

Berent R, Schuler J, Friedrich G

Trieb T, Wolf F, Reiter G

Sorantin E, Gamillscheg A

Hergan K

Journal für Kardiologie - Austrian

Journal of Cardiology 2013; 20

(1-2), 7-16

Homepage:

www.kup.at/kardiologie

Online-Datenbank
mit Autoren-
und Stichwortsuche



Offizielles
Partnerjournal der ÖKG



Member of the ESC-Editor's Club



Offizielles Organ des
Österreichischen Herzfonds



ACVC
Association for
Acute CardioVascular Care

In Kooperation
mit der ACVC

Indexed in ESCI
part of Web of Science

Indexed in EMBASE

Veranstaltungskalender

Hybrid-Veranstaltungen der Herausgeber des **Journals für Kardiologie**

Finden Sie alle laufend aktualisierten Termine
auf einem Blick unter

www.kup.at/images/ads/kongress.pdf

Klinischer Stellenwert und Indikationen zur Magnetresonanztomographie des Herzens 2013: Ein interdisziplinäres Expertenstatement*

S. Globits¹, C. Loewe², H. Schuchlenz³, B. Kaiser⁴, N. Fiegl⁵, A. Artmann⁶, K. Hawlisch⁵, S. Newrkla⁷, M. Gessner⁸, R. Bernt⁹, J. Schuler¹⁰, G. Friedrich¹¹, T. Trieb¹², F. Wolf², G. Reiter¹³, E. Sorantin¹⁴, A. Gamillscheg¹⁵, K. Hergan¹⁶

Kurzfassung: Die kardiale Magnetresonanztomographie (MRT) hat sich in den vergangenen Jahren in vielen Indikationen kontinuierlich erweitert. Dennoch hat sich die Akzeptanz der Methode bei den Kardiologen und Radiologen nicht mit jener Geschwindigkeit entwickelt wie die diagnostischen Möglichkeiten. Verantwortlich dafür sind unter anderem die kostspielige Ausstattung, die relativ lange Untersuchungszeit, das hohe Maß an technischem Wissen und nicht zuletzt die fehlende oder unzureichende Remuneration. Darüber hinaus sind ein Festhalten an traditionellen Abklärungsalgorithmen, ein limitierter Zugang zu dieser Technologie sowie Probleme in der fächerübergreifenden Kooperation zu beobachten.

Die seit vielen Jahren bestehende interdisziplinäre Kooperation für kardiale Schnittbildgebung hat die Aufgabe, einen substantiellen Beitrag zur Überwindung der genannten Problem-

felder zu leisten und die kardiale MRT in das Abklärungsspektrum kardialer Erkrankungen als fixen Bestandteil zu integrieren.

Eine kontinuierliche Verbesserung der Behandlung von Patienten mittels kosteneffizienter Diagnostik und Therapie hat hierbei höchste Priorität. Die kardiale MRT spielt dabei eine bedeutende Rolle.

Schlüsselwörter: MRT, Expertenstatement

Abstract: Clinical Relevance and Indications for Cardiac Magnetic Resonance Imaging 2013: An Interdisciplinary Expert Statement. During the last years the indications of Cardiac Magnetic Resonance Imaging (CMRI) have been continuously expanded. However, the acceptance of the method by cardiologists and

radiologists does not correlate with respect to the diagnostic potential. Several factors, such as expensive equipment, relatively long examination times, high technical know how and lack of remuneration, limit the application of CMRI in everyday clinical practice. Furthermore, doctors tend to apply more conventional, well established diagnostic procedures, the access to the method is still limited and there exist difficulties in the interdisciplinary collaboration.

The interdisciplinary Austrian approach to Cardiac Imaging is aimed to improve the aforementioned problems and to support the implementation of CMRI in the diagnostic tree of cardiac diseases thus enabling a cost efficient management of patients in cardiology. **J Kardiol 2013; 20 (1–2): 7–16.**

Key words: cardiac magnetic resonance imaging, MRI, expert statement

■ Einleitung

Diese Publikation befasst sich mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der MRT des Herzens [1]. Die MRT stellt bei bestimmten Fragestellungen die Untersuchungsmethode der ersten Wahl dar und trägt entscheidend zur Therapieplanung bei (Tab. 1). Zu den Vorteilen der Methode zählen unter anderem: Fehlende Invasivität und Strahlenexposition, beliebige Schichtführung, gleichzeitige Beurteilung kardialer und para-

kardialer Strukturen, sowie die Integration von Anatomie, Morphologie/Gewebedifferenzierung (durch unterschiedliche Pulssequenzen bzw. Kontrastmittelgabe) und Funktion in einem Untersuchungsgang. Bislang ist die MR-Untersuchung des Herzens in Österreich nicht flächendeckend verfügbar, obwohl komplementäre Informationen gewonnen werden, die mit keiner anderen Methode erzielbar sind. Insbesondere bei diskrepanten oder unklaren Befunden kann die MRT als Entscheidungsträger fungieren bzw. bei bestimmten Fragestellungen auch prognostische Informationen liefern. Im folgenden Beitrag werden die relevanten Indikationsgebiete dargestellt, auf physikalische Grundlagen und Details von Untersuchungsprotokollen wird nicht zuletzt wegen der kontinuierlichen technischen Weiterentwicklung bewusst verzichtet.

* Interdisziplinäre Doppelpublikation, erscheint auch in Abstimmung mit dem Verlag Thieme in RöFo.

Eingelangt am 03. November 2012, angenommen am 07. November 2012.

Aus dem ¹Herz-Kreislaufzentrum Groß Gerungs, der ²Universitätsklinik für Radiodiagnostik, Medizinische Universität Wien, dem ³Department für Kardiologie/Intensivmedizin, Landeskrankenhaus Graz-West, dem ⁴Diagnosezentrum Urania (DZU), Wien, der ⁵Abteilung für Kardiologie, KH Hietzing, Wien, dem ⁶Radiologischen Institut Wels, der ⁷Abteilung für Radiologie, SMZ Ost, Wien, der ⁸Medizinischen Abteilung, Kardiologie, Hanusch Krankenhaus, Wien, dem ⁹Zentralröntgeninstitut, Hanusch Krankenhaus, Wien, dem ¹⁰Gesundheitszentrum Aigen, Salzburg, der ¹¹Universitätsklinik für Innere Medizin 3, Kardiologie, Medizinische Universität Innsbruck, der ¹²Universitätsklinik für Radiologie, Medizinische Universität Innsbruck, von ¹³Siemens AG, Health Care Division, Graz, aus der ¹⁴Universitätsklinik für Radiologie, Klinische Abteilung für Kinderradiologie, Medizinische Universität Graz, der ¹⁵Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Klinische Abteilung für pädiatrische Kardiologie, Medizinische Universität Graz, und dem ¹⁶Universitätsinstitut für Radiologie, Universitätsklinikum Salzburg, Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Salzburg

Externe Experten-Gutachter: G. Mostbeck, Radiologie Wilhelminenspital und Otto-Wagner-Spital, Wien und Herbert Frank, Innere Medizin, KH Tulln

Korrespondenzadresse: Prim. Univ.-Doz. Dr. Sebastian Globits, Herz-Kreislaufzentrum Groß Gerungs, A-3920 Groß Gerungs, Kreuzberg 310; E-Mail: sebastian.globits@meduniwien.ac.at

■ Diagnostik der koronaren Herzerkrankung (KHK)

Bei Patienten mit KHK können mittels MRT folgende Aspekte diagnostisch abgedeckt werden:

1. Myokardperfusion in Ruhe und unter pharmakologischer Belastung
2. Globale und regionale Wandbewegungsanalyse
3. Vitalität zur Indikationsstellung betreffend Revaskularisation

Myokardperfusion in Ruhe und unter pharmakologischer Belastung

Alternativ zur etablierten Myokardszintigraphie kann die Herz-MRT mittels Stress-Perfusion das Vorhandensein von ischämischen Myokardabschnitten bei signifikanten Koronarstenosen dokumentieren. Der Vorteil gegenüber der Szinti-

Tabelle 1: Ausgewählte Indikationen zur kardialen MRT. Die Nummern entsprechen den Indikationsklassen. In der Regel sollte vor einer kardialen MRT eine Echokardiographie durchgeführt werden und daraus die Indikation abgeleitet werden. Mod. nach [2, 3].

Klasse 1: Klinisch relevante Informationen, meist Methode der 1. Wahl
Klasse 2: MR ist gleich wie andere bildgebende Verfahren; Alternative, Entscheidungshilfe
Klasse 3: MR primär nicht indiziert, da andere Verfahren besser
Klasse Inv: = investigativ: MR ist derzeit noch in Erprobung; zu wenige Daten vorhanden

	Morph.	Funkt.	LE	Perf.
KHK				
Nachweis KHK	3	2	1	1
Chron. Infarkt	3	2	2	2
Postinterventionell nach Bypass	3	2	2	2
Kardiomyopathie				
HCMP, DCMP	1	1	1	
RCMP	1	2	1	
ARVD	1	1	1	
Entzündung				
Myokarditis	1	1	1	
Perikarditis	1	1	1	
Konstr. Perikarditis	1	1	1	
Perikarderguss	1	1	1	
Raumforderung				
Herz	1	1	1	
Thrombus	1	2	1	
Perikard	1	1	1	
Klappen				
Stenose	3	2	3	
Insuffizienz	3	2	1	
Paravalv. Abszess	Inv	3	Inv	
Endokarditis	Inv	3	3	
Aorta				
Dissektion	2	2		
Aneurysma	2	2		
Isthmusstenose	2	2		

KHK: Koronare Herzkrankheit; Morph.: Morphologie; Funkt.: Funktion; LE: „late enhancement“; Perf.: Perfusion

graphie liegt nicht nur in der räumlichen Auflösung und der Vermeidung der Strahlenbelastung, sondern auch in der kürzeren Untersuchungsdauer.

Grundlage der Ischämiediagnostik mittels MRT ist die Darstellung der Passage eines paramagnetischen Kontrastmittelbolus durch das Myokard unter gleichzeitiger Anwendung eines pharmakologischen Stressors (z. B. Adenosin oder Dipyridamol).

In der im Jahr 2012 veröffentlichten Meta-Analyse [4] von 28 MRT-Studien (2970 Patienten), 10 Kontrastechostudien (795 Patienten) und 13 SPECT-Studien (1323 Patienten) waren Sensitivität und Spezifität der MRT verglichen mit der Koronarangiographie mit 91 % und 80 % signifikant besser als die der Echo- (87 % und 72 %) und SPECT-Studien (83 % und 77 %). Die Ergebnisse bestätigen die diagnostische Genauigkeit einer früheren Meta-Analyse [5]. Adenosin als pharmakologisches Stress-Agens erzielt dabei eine gering höhere Sensitivität und Spezifität als Dipyridamol (90 % und

81 % vs. 86 % und 77 %). Interessant ist, dass die visuelle Beurteilung keine Nachteile gegenüber einer semiquantitativen Datenanalyse bedeutet [4], die Sensitivität sogar höher ist (visuell: Sensitivität 91 %, Spezifität 79 % vs. semiquantitativ: 82 % bzw. 84 %). Während sich in der MR-IMPACT-II-Multicenter-Studie [6] die Stress-Perfusion mittels MRT der Myokardszintigraphie hinsichtlich der Sensitivität auf Kosten der Spezifität überlegen zeigte, war in der CE-MARC-Studie [7] die Sensitivität der Stress-Perfusion mittels MRT signifikant besser als die der Myokardszintigraphie, während die Spezifität identisch war. Die diagnostische Genauigkeit der Adenosin-Stress-MRT wird in einer weiteren Arbeit [8] bestätigt, in der die MRT mit der Druckdrahtmessung („fractional flow reserve“, FFR) während einer Koronarangiographie verglichen wird und eine Sensitivität und Spezifität von 91 % bzw. 94 % aufweist.

Bei Patienten mit koronarer Dreifäßerkrankung ist die MRT-Stress-Perfusion mittels Adenosin aufgrund der höheren räumlichen Auflösung der nuklearmedizinischen Technik überlegen, wie eine Studie mit angiographisch verifizierter Dreifäßerkrankung zeigt [9]. Diese Arbeit belegt, dass eine signifikant höhere Anzahl an Myokardischämie-Arealen mittels MRT detektiert werden kann als mittels Myokardszintigraphie (84,6 % vs. 55,1 %; $p < 0,001$ in 3 Gefäßgebieten).

Standardisiert sollten neben der Stress-Perfusion eine Ruhe-Perfusion und eine „late enhancement“-Bildgebung durchgeführt werden, um wahre Perfusionsdefekte von möglichen Artefakten zu unterscheiden, was die Spezifität erhöht. Zusätzlich kann im Rahmen eines akuten Koronarsyndroms wie auch im „late enhancement“ eine mikrovaskuläre Obstruktion in der Ruhe-Perfusionsstudie als subendokardiale dunkle Zone im pathologisch kontrastmittelverstärkten betroffenen Myokardareal dargestellt werden – ein prognostischer Marker für zukünftige kardiale Ereignisse [10].

Funktionsanalyse

Die MRT ist der Goldstandard für die Ventrikelfunktionsanalyse. Die Berechnung der enddiastolischen und endsystolischen Volumina des rechten und linken Ventrikels erfolgt primär an aufeinanderfolgenden Kurzschnittschnitten, welche die Ventrikel komplett erfassen, wobei jede einzelne Schicht manuell oder semiautomatisch planimetriert wird. Zu beachten ist, dass die Papillarmuskeln dem Ventrikelvolumen hinzugerechnet werden. Durch zusätzliche epikardiale Konturierung ist für den linken Ventrikel eine Bestimmung der Muskelmasse zuverlässig möglich. Hervorzuheben ist die geringe Interobservervariabilität der Methode [11]. Globale und regionale Wandbewegungsstörungen können zuverlässig beurteilt und letztere dem etablierten 17-Segmente-Modell zugeordnet werden [12]. Die fokalen Wandbewegungsstörungen werden als Hypokinesie, Akinesie und Dyskinesie klassifiziert. Bei der Beurteilung subtiler dyssynchroner Wandbewegungsstörungen ist die Sonographie bei entsprechender Schallqualität der MRT überlegen.

Die kardiale MRT liefert ergänzend morphologisch und funktionelle Informationen bei Komplikationen der KHK wie zum Beispiel dem ischämischen VSD, Ventrikelfisteln und intrakardialen Thromben.

Vitalitätsdiagnostik

Durch die MR-tomographische Abbildung des Myokards mindestens 5 Minuten nach Kontrastmittelgabe mithilfe einer „inversion recovery sequenz“ („late enhancement“, LE) kann fibrotisches Gewebe im Myokard dargestellt werden. Dem Ausmaß von postischämischen Narben kommt als prädiktiver Faktor für das Outcome nach Revaskularisation große Bedeutung zu. Mit zunehmender Transmuralität einer Infarktnarbe wird eine funktionelle Erholung nach Revaskularisation unwahrscheinlicher [13, 14].

Für die Vorhersage der Funktionsverbesserung nach Revaskularisationstherapie kann ergänzend zur Narbendarstellung mittels LE auch eine Stress-MRT unter Gabe von Low-dose-Dobutamin hilfreich sein. Dies trifft insbesondere für Narben mit transmuraalem Ausmaß von < 75 % zu [15, 16].

Eine zusätzliche Bedeutung hat die MRT des Herzens bei Patienten mit Herzinsuffizienz vor einer kardialen Resynchronisationstherapie (CRT-Schrittmachersystem) zur Verbesserung der linksventrikulären Auswurfraction. Die Erfassung von Ausmaß und Lokalisation myokardialer Narben mittels LE ist für die Vorhersage des zu erwartenden Therapieerfolgs und die optimale Platzierung der linksventrikulären Schrittmachersonde bedeutend [17, 18].

■ Nicht-ischämische Erkrankungen des Myokards

Kardiomyopathien

Kardiomyopathien sind eine heterogene Gruppe von Krankheiten des Herzmuskels, die mit mechanischen, strukturellen und/oder elektrischen Funktionsstörungen bei fehlender koronarer Herzerkrankung, Hypertonie, Herzklappenerkrankung und angeborenen Herzfehlern einhergehen und eine unangemessene Hypertrophie des Myokards oder eine Dilatation der Herzkammern verursachen. Ihre Ursachen sind vielfältig und häufig genetisch bedingt. Kardiomyopathien begrenzen sich entweder auf das Herz oder sind Teil einer allgemeinen Systemerkrankung [19]. Die kardiale MRT bietet bei exzellentem Blut- und Weichteilkontrast eine Fülle von diagnostischen und prognostischen Informationen [20, 21].

Bei Problemen in der echokardiographischen Bildgebung im Rahmen der Basisdiagnostik der Herzinsuffizienz sollte die MRT frühzeitig eingesetzt werden. Neben dem Nachweis und der Typisierung von Myokardschäden in der LE-Sequenz können mittels MRT auch inter- und intraventrikuläre Leitungsstörungen in dynamischen Cinesequenzen dargestellt und eine Vorhersage betreffend Ansprechen auf eine kardiale Resynchronisationstherapie (CRT) getroffen werden. So konnte gezeigt werden, dass der Erfolg einer CRT und die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten schlechter sind, je höher die Narbenbelastung des Myokards ist. Eine Positionierung der linksventrikulären Sonde im Narbengewebe erzielt keinen verbesserten hämodynamischen Effekt [22, 23].

Die MRT kann weiterhin vor einer diagnostischen Myokardbiopsie hilfreich bei der Wahl der Biopsiestelle sein [24]. Man

unterscheidet morphologisch dilatative, hypertrophe, restriktive, arrhythmogene, rechtsventrikuläre und unklassifizierte Kardiomyopathien. Eine weitere Einteilung erfolgt in familiär gehäufte (genetisch bedingte) und nicht-familiäre (nicht genetisch bedingte) Formen [25].

Bei Kardiomyopathien sollten folgende Punkte im Befund besonders berücksichtigt werden:

1. Beurteilung der globalen und regionalen Funktion beider Ventrikel
2. Morphologische Beschreibung und Gewebscharakterisierung des Myokards
3. Beurteilung begleitender Pathologien (Perikarderguss, Fettinfiltrationen, etc.)

Differentialdiagnose „Dilatative Kardiomyopathie“ (CMP) vs. „Ischämische CMP“

Bei Patienten mit reduzierter linksventrikulärer Pumpfunktion kommt der Differentialdiagnose zwischen dilatativer Kardiomyopathie (CMP) und ischämischer CMP eine fundamentale Bedeutung im Hinblick auf das therapeutische Management zu [26]. Mittels Echokardiographie ist diese Unterscheidung in der Regel nicht möglich, da das Kriterium der regionalen Wandbewegungsstörung nicht auf ischämische Formen der CMP beschränkt ist. Durch Einsatz der kontrastmittelverstärkten MRT können umschriebene intramyokardiale Fibroseherde oder Striae dargestellt werden. Bei der dilatativen CMP treten diese gehäuft intramyokardial im Ventrikelseptum oder subepikardial auf, bei der ischämischen CMP sind diese typischerweise subendokardial bis transmural lokalisiert. Eine eindeutige Differenzierung hinsichtlich einer ischämischen oder nicht-ischämischen (z. B. postinfektiösen oder toxischen) Genese ist aber auch durch das Muster der Kontrastmittelanreicherung nicht immer möglich.

Charakterisierung der hypertrophen Kardiomyopathie (HCM)

Die hypertrophe CMP ist eine genetisch bedingte Erkrankung der Actin- und Myosinfilamente und kann verschiedene Ausprägungsformen haben [27]. Die MRT erlaubt durch ihre dreidimensionale Erfassung beider Ventrikel in jeder beliebigen Schichtführung eine exakte Lokalisation der hypertrophierten Myokardareale und ist vor allem bei der Diagnose der apikalen HCM der Echokardiographie deutlich überlegen. Ein variabel auftretendes LE-Muster ist fleckförmig, meist intramural in hypertrophierten Arealen oder im Ventrikelseptum und an der RV-Insertionsstelle im Septum [27]. In einigen Studien konnte auch ein Zusammenhang zwischen dem Nachweis einer pathologischen intramyokardialen Kontrastmittelanfärbung und der Prognose des Patienten gezeigt werden. Zusätzlich kann bei der hypertroph obstruktiven CMP eine Flussbeschleunigung in der Obstruktion visualisiert werden [28].

Diagnose der Non-compaction-Kardiomyopathie

Dies ist eine seltene Form einer CMP mit embryologisch bedingt fehlender Apposition der einzelnen Myokardschichten und konsekutiver Ausbildung tiefer Fissuren und Lakunen an der luminalen Seite des Myokards [29]. Besonders bei der apikalen Form können diese tiefen Lakunen sonographisch

eine Pseudohypertrophie vortäuschen. Mittels MRT gelingt eine exakte anatomische Darstellung inklusive möglicher Thromben sowie die Differenzierung zwischen einer apikalen HCM, leichter apikaler Hypertrabekulierung (≤ 3 Trabekel) und Non-compaction-CMP. Das Verhältnis „non-compacted/compacted“ Myokard $> 2,3 : 1$ diastolisch im Vierkammerblick besitzt für diese Erkrankung eine hohe Sensitivität (85 %) und Spezifität (99 %) [30]. Die kardiale MRT ist in der Lage, Fibrosebezirke darzustellen [31].

Diagnose der stressassoziierten Kardiomyopathie (Tako-Tsubo)

Bei dieser unklassifizierten Herzmuskelerkrankung, die häufig nach emotionalen Stresssituationen und überwiegend bei Frauen auftritt, und sowohl im Beschwerdebild, hinsichtlich der EKG-Veränderungen wie auch der Laborwerte wie ein akuter Herzinfarkt imponiert, zeigt sich typischerweise eine aneurysmatische Auswölbung und Akinesie des Apex und in variablen Teilen der Vorderwand. In der Koronarangiographie finden sich keine signifikanten Koronarstenosen oder -verschlüsse. Mithilfe T2-gewichteter Sequenzen kann ein intramyokardiales Ödem dargestellt werden, ein ischämietypisches LE wird in der Regel nicht gefunden [32]. Neben der genauen Beschreibung der betroffenen linksventrikulären und selten auch rechtsventrikulären Myokardsegmente kann mit der MRT im Gegensatz zur Echokardiographie das Vorhandensein von thrombotischen Massen frühzeitig erfasst werden [33].

Diagnose der restriktiven Kardiomyopathie

Im Rahmen seltener primärer/idiopathischer sowie sekundärer restriktiver Kardiomyopathien kommt es zu einer Versteifung des Myokards mit konsekutiver Füllungsbehinderung. Die häufigsten Formen der restriktiven CMP sind die infiltrativen Kardiomyopathien (Amyloidose), entzündlich-granulomatöse Kardiomyopathien (Sarkoidose), Speichererkrankungen (Hämochromatose, Morbus Fabry, Glykogenspeichererkrankungen), das Hypereosinophilie-Syndrom und die Endomyokardfibrose [34]. Auch Anthrazykline und andere chemotherapeutische Substanzen sowie die Strahlentherapie können den Herzmuskel schädigen. Bei den meisten sekundären Formen der restriktiven CMP finden sich in der kardialen MRT unterschiedliche LE-Muster, die in der Differenzierung hilfreich sein können. So zeigt beispielsweise die kardiale Amyloidose ein inhomogenes und zeitlich variables LE-Muster, das damit pathognomonisch wird [35].

Von therapeutischer Konsequenz ist die Abgrenzung der restriktiven CMP von der Pericarditis constrictiva. Die MRT ist dabei durch den Nachweis eines intramyokardialen LE, die Abgrenzung des Perikards und der Beurteilung der Vorhofsgröße hilfreich, sollte aber durch eine funktionelle Echodoppleruntersuchung ergänzt werden [36].

■ Myokarditis

Die klinische Diagnose der Myokarditis ist schwierig, die Symptome der Patienten sind häufig uncharakteristisch. Die Konstellation der Laborbefunde (einschließlich Virusserologie), des EKG wie auch der Echokardiographie sind unspezifisch und daher auch in der Diagnostik nicht sehr hilfreich.

Die MR-Untersuchung des Herzens hat die Myokarditisdiagnostik maßgeblich erweitert. Gekennzeichnet ist die Myokarditis durch ein Ödem des Myokards in T2-gewichteten Sequenzen und durch kontrastanreichernde Infiltrate in den LE-Sequenzen [37, 38]. Meist ist die laterale oder ventrale Wand des linken Ventrikels betroffen [39]. Die Infiltrate finden sich unabhängig von den vaskulären Territorien und liegen eher intramural und subepikardial, viel seltener subendokardial [40, 41]. Sind Veränderungen dieser Art im Septum sichtbar, sollte man auch an eine Sarkoidose denken.

Die Myokardbiopsie spielt einerseits bei der akut fulminanten Myokarditis zum Nachweis einer behandelbaren Ursache (z. B. „giant cell“ oder eosinophile Form), andererseits beim Nachweis einer chronischen Myokarditis eine Rolle, die sich in der kardialen MRT allenfalls durch die Messung der Signalintensitätsänderung in der T2-gewichteten bzw. T1-gewichteten Spinecho-Sequenz vor und nach Kontrastmittelgabe darstellen lässt [42]. Die Bestimmung des Quotienten der Signalintensitäten aus Myokard und Skelettmuskel haben sich aufgrund der notwendigen Erfassung standardisierter gerätespezifischer T1- und T2-Werte in der Routine nicht bewährt. Die ursprüngliche Hoffnung, die Effektivität einer Biopsie durch eine präinterventionelle MRT zu verbessern, hat sich in einer rezenten Studie nicht bestätigt. Im Wesentlichen wird der Erfolg der Biopsie durch die Zahl der biventrikulären Biopsate erhöht [43]. Die kardiale MRT hat zudem einen prognostischen Stellenwert in der Verlaufskontrolle der Myokarditis [44].

■ Rechtsventrikuläre Myokarderkrankungen

Die arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie/Dysplasie (ARVC/D) ist eine seltene genetische Erkrankung, die mit einem progredienten Ersatz von Myozyten durch Fett- und Bindegewebe einhergeht.

Seit Einführung der MRT in die kardiale Bildgebung wurde die Methode primär zum Nachweis von pathologischem Fettgewebe innerhalb des Myokards verwendet [45]. Obwohl es dazu hervorragende pathologisch-anatomische Korrelationsstudien gibt, hat sich im klinischen Alltag gezeigt, dass, bedingt durch inkonstante Bildqualität auf Spinechosequenzen und Fehlinterpretation von Artefakten, die Sensitivität zur Erkennung von intramyokardialen Fettgewebe zwischen 22 und 67 % liegt [46, 47] und dass eine erhebliche Interobservervariabilität vorliegt [48]. Weiters gibt es verschiedene histologische Subtypen mit unterschiedlichem Anteil an Binde- und Fettgewebe. Aus diesen Gründen wurde in den rezenten Guidelines der SCMRI der Fettnachweis als Hauptkriterium für das Vorliegen einer ARVD gestrichen, dafür ist als weiteres Kriterium der Nachweis von Bindegewebe mittels später Kontrastmittelanreicherung unter Verwendung von Gadolinium (LE) eingeführt worden [49].

Auch andere Kriterien der ARVD, wie umschriebene oder generalisierte Wandverdünnungen, dyskinetische Segmente (Aneurysmen) oder Erhöhung der rechtsventrikulären Füllungsvolumina mit reduzierter Auswurfraction, können mittels MRT exakt diagnostiziert werden. Entscheidend ist bei der regionalen Wandbewegungsanalyse, dass „Norm-

varianten“ der RV-Funktion berücksichtigt werden, um eine Überbefundung zu vermeiden. Dazu gehört ein „physiologisches“ endsystolisches Bulging eines dünnen, aber normokinetischen Wandabschnittes (typischerweise im Bereich des Moderatorbandes) oder eine als „dyskinetisch“ imponierende Diaphragmalwand in der kurzen Achse, bedingt durch die Bewegung der Ventilebene relativ zur Schnittebene („through-plane motion“). Ein Ausschluss einer ARVD/C kann mittels MRT alleine nicht erfolgen. Zur endgültigen Diagnose sind die internationalen Task-Force-Kriterien anzuwenden [49].

Eine eigene Entität stellt die benigne rechtsventrikuläre Ausflusstrakttachykardie dar, bei der es meist belastungsinduziert zu anhaltenden steiltypischen linksschenkelblockartigen ventrikulären Tachykardien kommt, die in der Regel nicht zu Synkopen oder zum plötzlichen Herztod führen. Bei diesem seltenen Krankheitsbild konnten mittels MRT Veränderungen im Bereich des rechten Ventrikels gefunden werden, die an milde Formen der ARVD erinnern [50].

■ Erkrankungen des Perikards

Charakterisierung von Perikardergüssen

Mittels MRT kann durch Anwendung unterschiedlicher Pulssequenzen eine Differenzierung zwischen serösen oder hämorrhagischen Ergüssen anhand der unterschiedlichen Signalintensitäten getroffen werden. Darüber hinaus ist eine Abschätzung des Ergussvolumens möglich. Speziell bei Patienten mit lokalisierten Ergüssen oder begleitenden Pathologien (abnorme Fettinfiltration oder perikardiale Tumore) ist die MRT der Echokardiographie deutlich überlegen, die aber die Diagnostik der ersten Wahl darstellt [51].

Perikarditis

Die MRT hat eine hohe Sensitivität bei der Diagnosestellung einer Perikarditis. Dabei helfen morphologische Kriterien wie Perikarddicke (> 3 mm) und Perikarderguss (ev. lokalisiert) sowie eine Kontrastmittelanreicherung. Eine mögliche entzündliche Mitbeteiligung des Myokards lässt sich dadurch ebenfalls erfassen.

Konstriktive Perikarditis

Die konstriktive Perikarditis ist Folge eines chronischen Entzündungsprozesses, einer Herzoperation oder einer Radiatio und kann verkalkt oder nicht verkalkt in Erscheinung treten. Mittels MRT gelingt eine exakte Darstellung des verdickten Perikards (> 3 mm) sowie eine Quantifizierung der kleinen Ventrikelvolumina und der erhöhten Vorhofvolumina [52]. Typisch ist eine Veränderung der Ventrikelgeometrie mit gestrecktem Ventrikelseptum und Impression der freien rechtsventrikulären Vorderwand. Der Schweregrad der konsekutiven Einflussstauung kann durch Diameterbestimmung der beiden Hohlvenen abgeschätzt werden. Eine normale Perikarddicke (1–3 mm) schließt eine konstriktive Perikarditis aus. Mittels MRT-Tagging-Technik kann die relative Bewegungsdifferenz zwischen dem starren Perikard und dem hyperdynamen Myokard veranschaulicht werden. Ähnlich wie in der Echokardiographie kann mittels Real-time-MRT in In- und Expiration der typische Shift des interventrikulären Septums dargestellt werden.

Bei der kalzifizierten Perikarditis ist aufgrund des fehlenden MR-Signals von Kalk eine ergänzende Computertomographie sinnvoll, sofern nicht bereits die native Röntgenuntersuchung eine Perikardverkalkung nachgewiesen hat. Differentialdiagnostisch können mittels MRT perikardiale Adhäsionen unterschieden werden, die je nach Ausprägungsgrad zu einer Behinderung der RV-Funktion führen können [51].

Benigne Zysten

Perikardzysten treten typischerweise im Bereich beider Herz-Zwerchfellwinkel auf und zeigen einen Kontakt zu Perikard und/oder Diaphragma. Sie sind glatt begrenzt und weisen ein charakteristisches Signalverhalten auf (bei niedrigem Eiweißgehalt hypointens auf T1- und hyperintens auf T2-gewichteten Spinechosequenzen, starke Signalzunahme auf Inversionspulssequenzen) [53].

■ Herztumore

Die häufigsten intrakardialen Raumforderungen sind Thromben. Sie sind besonders im Apexbereich mittels Echokardiographie gelegentlich nicht darstellbar. Diese Thromben können mithilfe der MRT zuverlässig dargestellt werden. Das Signalverhalten kann auch einen Hinweis auf das Alter des Thrombus geben.

Primäre Herztumore sind mit 0,1 % aller Tumore sehr selten [54]. Der häufigste benigne Tumor ist das (Vorhof-) Myxom, welches meist im Bereich der Vorhöfe lokalisiert ist [55]. Charakteristischerweise sitzt das Vorhofmyxom gestielt am interatrialen Septum und prolapiert abhängig von der Größe und Mobilität diastolisch in oder durch die AV-Klappenebene. Morphologisch ist das Myxom glatt begrenzt mit inhomogenem Signalverhalten (regressive, zystische Areale) und zeigt nach Kontrastmittelgabe eine variable Signalzunahme.

Primäre maligne Herztumore sind vor allem diverse Sarkome. Diese weisen ein infiltratives Wachstum mit begleitendem, hämorrhagischen Erguss auf. Je nach Vaskularisationsgrad kommt es nach KM-Gabe zu einer Anreicherung mit Signalanhebung. Der diagnostische Vorteil der MRT liegt vor allem in der gleichzeitigen Beurteilung der parakardialen Strukturen. Dies ist besonders hilfreich bei der Zuordnung von Metastasen.

Als tumorös imponieren gelegentlich die fokale HCM, Sarkoidose, Amyloidose sowie anatomische Varianten (Crista terminalis etc.).

Der hohe Stellenwert der kardialen MRT liegt in der Differenzierung, Lokalisierung und ggf. Operationsplanung echokardiographisch detektierter raumfordernder Läsionen.

■ Klappenerkrankungen

Während bei Klappenstenosen mittels Dopplersonographie und Herzkatheter Druckgradienten und Klappenöffnungsflächen exakt bestimmt werden können, stellt die Quantifizierung von Klappeninsuffizienzen nach wie vor eine diagnostische Herausforderung dar, da die meisten Methoden nur eine semiquantitative Beurteilung des Schweregrades erlauben. Die MRT hat auf diesem Gebiet das diagnostische Spektrum

erweitert [56–58] und dient dazu, die Operationsindikation zu stellen oder zu festigen. Bei singulären Klappeninsuffizienzen kann aus dem Vergleich von links- und rechtsventrikulärem Schlagvolumen die Regurgitationsfraktion an der Herzklappe bestimmt werden. Exakter und vor allem, wenn mehrere Klappen insuffizient sind, können durch Anwendung der Phasenkontrasttechnik in der Aorta ascendens und dem Pulmonalarterienhauptstamm die Differenz zwischen Vorwärtsschlagvolumen und Gesamtschlagvolumen aus der Volumetrie bestimmt werden [59–63]. Die Aortenklappenstenose ist keine primäre Indikation zur MRT, nur bei unklaren oder discrepanten echokardiographischen Befunden kann eine planimetrische Bestimmung der Aortenöffnungsfläche hilfreich sein [64]. Die Pulmonalklappenerkrankungen und deren Folgen lassen sich mittels kardialer MRT sehr gut abklären bzw. die Interventions-/Operationsindikation besser abschätzen als mit anderen Methoden

■ Endokarditis

Die Echokardiographie (bevorzugt die transösophageale Untersuchung) ist gemeinsam mit klinischen und mikrobiologischen Befunden der Goldstandard in der Diagnose der Endokarditis. Die MRT spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Eine myxomatös degenerierte Herzklappe kann in der MRT wie eine Endokarditis imponieren. Paravalvuläre Abszesse lassen sich mit der MRT erfassen, sind jedoch mittels Herz-CT besser zu lokalisieren.

■ Kongenitale Vitien im Kindesalter

Angeborene Herzfehler finden sich in einer Inzidenz von knapp < 1 % aller Neugeborenen [65]. Dank der enormen medizinischen Fortschritte und der damit gestiegenen Lebenserwartung dieser Patienten hat sich die Relation zwischen Kindern und Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern verschoben [66, 67]. So sind mittlerweile 80 % der Patienten mit einer Fallot'schen Tetralogie älter als 20 Jahre. Die Echokardiographie ist mit zunehmendem Alter der Patienten limitiert. Insbesondere bei Funktionsuntersuchungen des rechten Ventrikels hat sich die kardiale MRT mittlerweile als Goldstandard etabliert [68].

Die MRT des Herzens ist der Echokardiographie bei folgenden Fragestellungen überlegen: rechtsventrikuläre Volumetrie und Auswurffraktion, Evaluierung des rechtsventrikulären Ausflusstrakts und von pulmonal-arteriellen Conduits, Quantifizierung der Pulmonalklappeninsuffizienz durch Bestimmung der Regurgitationsfraktion der Pulmonalklappe, Erfassung von peripheren Pulmonalarterienstenosen und Aneurysmen, Anatomie der Abklärung von System- und Pulmonalvenenanomalien bzw. deren Varianten und Fehlmündungen, Darstellung von komplexen Anomalien des Aortenbogens bzw. arteriovenösen Malformationen und Kollateralen, bei intra- und extrakardialen Raumforderungen/Tumoren, Bestimmung der biventrikulären Muskelmassen, Detektion und Quantifizierung von Myokardfibrosen sowie bei Gewebecharakterisierung (Fett, Eisen etc.).

Bei vermuteten Koronaranomalien (z. B. im Rahmen von belastungsinduzierten Synkopen) sollte bei jungen Patienten

aufgrund der fehlenden Strahlenexposition die MRT zur Anwendung kommen (Akquisition eines 3D-Datensatzes). Dies gilt auch für die Nachsorge bei Patienten mit Kawasaki-Syndrom.

■ Kongenitale Vitien im Erwachsenenalter

Seit Einführung der Herz-MRT stellen die kongenitalen Vitien ein Hauptindikationsgebiet dar. Besonders im Erwachsenenalter eignet sich die Methode zur Verlaufskontrolle bzw. zur Kontrolle von postoperativen Befunden und ersetzt – zusammen mit der Echokardiographie – in der Regel die Herzkatheteruntersuchung [69]. Dreidimensionale Analysen mithilfe der MRT erlauben eine exzellente Darstellung der oft komplexen postoperativen Anatomie.

Da mittels Spinechotechnik Vorhofseptumdefekte (ASD) übersehen oder überdiagnostiziert werden können, sind funktionelle Aufnahmen mit Gradientenechosequenzen erforderlich.

Die Beurteilung der rechtsventrikulären Morphologie, Funktions- und Volumenbestimmung ist eine Domäne der MRT. Die flusssensitiven Sequenzen erlauben eine Darstellung von Shuntflüssen und palliativ angelegten Gefäßverbindungen [70]. Ebenso kann ein Ventrikelseptumdefekt (VSD) nach Lokalisation klassifiziert (membranös, muskulär, supraapikal), assoziierte Fehlbildungen (z. B. bikuspidale Aortenklappe) können diagnostiziert werden.

Die Bestimmung von Shuntgrößen im Rahmen von fehlmündenden Lungenvenen, ASD, VSD, offenem Ductus botalli und Koronarfsteln gelingt unter Verwendung der quantitativen Flussmessung mittels Phasenkontrasttechnik in Aorta und Pulmonalarterie. Daraus können das Verhältnis von pulmonalem zu systemischen Blutfluss und damit die Shuntfraktion direkt bestimmt werden [70]. Im Falle einer begleitenden Pulmonalstenose mit systolischen Turbulenzen im Pulmonalishauptstamm kann eine Bestimmung des Blutflusses selektiv im linken und rechten Pulmonalgefäß erfolgen.

Im Fall einer isolierten Pulmonalinsuffizienz kann einerseits aus der volumetrischen Differenz von links- und rechtsventrikulärem Schlagvolumen oder durch direkte Flussbestimmung im Pulmonalishauptstamm eine Regurgitationsfraktion bestimmt werden. Dies ist bei Patienten nach Totalkorrektur eines M. Fallot von besonderer klinischer Bedeutung [71].

Abgangs anomalien der Koronargefäße können eine hohe klinische Relevanz haben und können mittels MR-Angiographie (Akquisition eines 3D-Datensatzes) dargestellt werden.

■ Pathologien der Aorta

Aneurysmen und Dissektionen

Bei klinisch stabilen Patienten stellt die MRT der Aorta eine Alternative zur CT-Angiographie bei der Abklärung, aber auch bei der Therapiekontrolle von Patienten mit Aortenaneurysmen und Aortendissektionen dar. Durch Kombination von anatomischen Bildern (Spinechosequenzen mit und ohne Fettsättigung) mit flusssensitiven Sequenzen und kontrastverstärkter 3D-MR-

Angiographie können mittels MRT alle relevanten Befunde (Aortendurchmesser, Wandbeschaffenheit, Thromben sowie Blutfluss im wahren und falschen Lumen) [72, 73] erhoben werden. Auch eine Stentgraftplanung zur Behandlung eines Aortenaneurysmas ist mit hochauflösenden, kontrastmittelverstärkten 3D-Sequenzen mit multiplanaren Reformationen möglich. Bei der Abklärung von thorakalen Aortenpathologien, wie zum Beispiel bei der Abklärung eines Aneurysmas des Sinus valsalvae, können assoziierte Klappenvitien mittels Gradientenecho nicht nur dargestellt, sondern durch Verwendung flusssensitiver Sequenzen auch quantifiziert werden.

Kongenitale Aortenerkrankungen

Aufgrund der Möglichkeit, anatomische und funktionelle Informationen nicht-invasiv in einer Untersuchung zu erfassen, spielt die MRT in der Abklärung angeborener Erkrankungen des Aortenbogens, welche im Erwachsenenalter einer Echokardiographie nur eingeschränkt zugänglich sind, eine tragende Rolle. Durch Kombination von anatomischer und funktioneller Bildgebung mittels MRT kann eine Aortenisthmusstenose diagnostiziert und die hämodynamische Relevanz quantifiziert werden. Der Kollateralfloss kann durch Zunahme des aortalen Blutvolumens von proximal nach distal mittels quantitativer Flussmessung bestimmt werden [74]. Zur Verlaufskontrolle von Patienten nach operativer Sanierung einer Aortenisthmusstenose ist die MRT die Methode der ersten Wahl. Demgegenüber ist nach Ballondilatation und Stentimplantation wegen möglicher MRT-Artefakte die CT vorzuziehen.

■ 3-Tesla-MRT in der Herzbildgebung

Viele Anwendungen der Herz-MRT weisen technisch bedingt relativ geringe Signal- und Kontrast-zu-Rausch-Verhältnisse (SNR und CNR) auf, sodass die Durchführung der Herzbildgebung bei 3T anstelle der etablierteren 1,5 T sehr viel versprechend erscheint [75, 76].

Die zunehmende Magnetfeldstärke bringt aber auch Effekte wie einen stärkeren magnetohydrodynamischen Effekt im EKG, geänderte magnetische Relaxationszeiten, geänderten „chemical shift“, vermehrte Inhomogenitäten des anregenden Hochfrequenzfeldes, höhere spezifische Absorptionsraten (SAR) bei gleichen Sequenzparametern und schlussendlich größere Magnetfeldinhomogenitäten mit sich [75, 76]. Besonders drastisch ist diese Situation bei der Steady-State-Free-Precession-Sequenz (SSFP), für deren Anwendung bei 3 T verbesserte Shim-Prozeduren [77, 78] und/oder eine über Scouting zu bestimmende Optimierung der Resonanzfrequenz [79] verwendet werden müssen, um Banding-Artefakte zu vermeiden.

Die Datenlage bzgl. einer möglichen Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit der kardialen MRT bei 3 T ist sehr limitiert. Während die Gewinnung funktioneller Parameter ähnliche Ergebnisse bei 1,5 und 3 T liefert [80–82], scheinen sich Vorteile von 3 T vor allem bei kontrastmittelunterstützten Techniken (Angiographien, Vitalitätsdiagnostik und Perfusion) abzuzeichnen. So konnten beispielsweise bei 3 T im direkten Patienten- und Feldstärkevergleich erhöhte Sensitivität, Genauigkeit und Spezifität der Adenosin-Stress-Perfu-

Tabelle 2: Kontraindikationen einer Herz-MRT

Absolute Kontraindikationen

- Defibrillatoren, Herzschrittmacher und stillgelegte Elektroden (Ausnahme siehe Text)
- Neurostimulatoren
- Implantierte Pumpen
- Ferromagnetische Fremdkörper an kritischen Organen wie Gehirn, Rückenmark, Augen
- Hautklammern nach Operation, Vollgips
- Starr-Edwards-Herzklappe
- Swan-Ganz-Katheter, Hirndrucksonde, Harnkatheter mit Temperatursonde
- HAS-Schulterprothese
- Zahnprothetik mit Magnetfixierung

Relative Kontraindikationen

- Implantate jeder Art, wenn diese nicht als „sicher“ eingestuft sind (Pass, Website der Firma des Implantates); siehe z.B. www.mri-safety.com, www.mrcomp.com [90].

sion zum Nachweis von hämodynamisch relevanter Koronarstenosen bei Verdacht auf koronare Herzkrankheit gefunden werden [83]. Dies wird jedoch in einer aktuellen Meta-Analyse [84] drastisch relativiert.

Berücksichtigt man schlussendlich noch die Tatsache, dass kardiale Implantate, sofern sie auch getestet wurden, typischerweise ähnliche Sicherheitseigenschaften bei 1,5 und 3 T aufweisen [85], so lässt sich zusammenfassend wohl ein großes Potenzial der 3-T-Herzbildgebung erkennen. Es bleibt abzuwarten, ob die Vorteile von 3 T gegenüber 1,5 T in der Herzbildgebung auch so eindeutig und bedeutend wie etwa bei der Neuro- oder Muskuloskelettal-Radiologie sein werden.

■ Sicherheitsaspekte und Kontraindikationen der MRT

Generell gelten für eine MRT des Herzens die selben Ausschlusskriterien und Kontraindikationen wie für jede andere MR-Untersuchung (Tab. 2). Die heute implantierten Klappen, Stents, Stent-Grafts und anderen herzspezifischen Implantate wie Coils oder Okkluder sind im Allgemeinen MR-tauglich bzw. nach neuer Nomenklatur (bedingt) MR-sicher, in der Regel sogar unmittelbar nach Implantation, und stellen keine Kontraindikation gegen eine MRT dar. Subkutan implantierte Kardio-Rekorder sind ebenfalls bedingt MR-sicher, die relevanten Daten sollten jedoch vorher ausgelesen werden und spezifische Anweisungen des Herstellers müssen befolgt werden.

Im Gegensatz dazu stellen Herzschrittmacher und vor allem ICD-Systeme prinzipiell primäre Kontraindikationen dar. Es ist nicht nur eine passagere und ggf. dauerhafte Funktionsstörung möglich, sondern es kann auch zu Spontanentladungen und zu Sondenerwärmung kommen. Bei niedrigen Feldstärken bis 1,5 Tesla ist unter kardiologischer Assistenz eine allgemeine MR-Untersuchung bei liegendem Herzschrittmacher möglich [86–88], jedoch als Routineverfahren abzulehnen.

Mittlerweile werden spezielle Herzschrittmacher- und Defibrillatorsysteme ohne Verwendung ferromagnetischer Materialien angeboten, welche als bedingt MR-sicher eingestuft

sind und bei Einhaltung von bestimmten Vorgaben (Sicherheitsmaßnahmen, Umprogrammierung, energieadaptierte MR-Sequenzen) keine Kontraindikation darstellen [89].

Kontrastmittelallergie und Niereninsuffizienz sind relative Kontraindikationen, die teilweise medikamentös gut beherrschbar sind. Hier sind die Leitlinien der European Society of Urologic Radiology (www.esur.org) in der aktuellen Version zu beachten.

■ Patientenvorbereitung

Grundsätzlich sind die allgemeinen Richtlinien bezüglich Patientensicherheit und Kontrastmittelsicherheit in der MRT wie bei allen anderen MRT-Untersuchungen anzuwenden. Speziell sollten die Patienten auf die lange Untersuchungsdauer (ca. 50 Minuten) und Sequenzen in Atemanhalte-technik vorbereitet werden. Etwaige sprachliche Barrieren sind zu beachten. Bei pharmakologischer Stressuntersuchung sollten 2 venöse Zugänge vorhanden sein und die Patienten über die speziellen Vorkehrungen (Adenosin: Koffeinkarenz; Dobutamin: keine Betablocker) aufgeklärt werden. Bei Patienten mit Klaustrophobie helfen teilweise Spiegelkonstruktionen oder eine alternative Lagerungstechnik. Eventuell ist die Anwesenheit einer Begleitperson im Untersuchungsraum hilfreich. Kinder dürfen ab dem 14. Lebensjahr selbstständig der Untersuchung zustimmen oder diese ablehnen (Teilrechtsfähigkeit).

■ Zuweisung

Da die MRT des Herzens ein breites diagnostisches Spektrum bietet, sind klare Zuweisungsdiagnosen und gezielte bzw. klinisch relevante Fragestellungen notwendig. Die Zuweisung kann durch alle Fachbereiche erfolgen, nach entsprechender Konsultation der die MRT durchführenden Ärzte (Kardiologe, Radiologe) zur Überprüfung der sinnvollen Indikation. Vorhandene kardiologische Vorbefunde (insbesondere Echokardiographie) und aktuelle Laborbefunde (insbesondere Kreatininwerte und glomeruläre Filtrationsrate vor Kontrastmitteldosis) sind beizulegen. Etwaige Kontraindikationen sind im Vorfeld abzuklären.

■ Zusammenfassung

Die MR-Untersuchung des Herzens hat sich als ergänzendes diagnostisches Verfahren etabliert und dient bei bestimmten Fragestellungen als Entscheidungshilfe im oberen Bereich der kardiologischen Diagnoseleiter. Mittels MRT können bei fast allen kardialen Erkrankungen relevante Zusatzinformationen gewonnen werden. Bei der Diagnostik der Myokarditis stellt die MRT die Methode der Wahl aller bildgebenden Verfahren dar. Die MRT hat bei der Vitalitätsdiagnostik einen zentralen Stellenwert zur Entscheidung betreffend Revaskularisation. Darüber hinaus kann mittels MRT eine sinnvolle Ischämiediagnostik angeboten werden. Im Rahmen der Abklärung von Kardiomyopathien kann die MRT wesentliche Informationen zur Genese liefern.

Eine weitere Verbreitung der Methode kann durch eine Standardisierung der Untersuchungsprotokolle, durch interdisziplinär abgestimmte Leitlinien zum Einsatz der MRT bei Er-

krankungen des Herzens und durch qualifizierte Weiterbildung junger Ärzte erreicht werden.

■ Interessenkonflikt

Der Erstautor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

■ Danksagung

Die Autoren bedanken sich bei Herrn Prim. Univ.-Prof. Dr. Herbert Frank, Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Landeskrankenhaus Tulln, und Herrn Prim. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Mostbeck, Leiter des Zentralröntgeninstitutes am Wilhelminenspital und Otto-Wagner-Spital Wien, für die fachlich unabhängige Revision des Manuskriptes.

Literatur:

- Achenbach S, Barkhausen J, Beer M, et al. Konsensempfehlungen der DRG/DGK/DGPK zum Einsatz der Herzbildgebung mit Computertomografie und Magnetresonanztomografie. *Fortschr Röntgenstr* 2012; 184: 345–68.
- Lotz J, Kivelitz D, Fischbach R, Beer M, Müller S. Empfehlungen für den Einsatz der Computertomografie und Magnetresonanztomografie in der Herzdagnostik. Teil 2 – Magnetresonanztomografie. *Fortschr Röntgenstr* 2009; 181: 800–14.
- Pennell DJ, Sechtem UP, Higgins CB, et al. Clinical indications for cardiovascular magnetic resonance (CMR): Consensus Panel report. *Eur Heart J* 2004; 25: 1940–65.
- de Jong MC, Genders TSS, van Geuns RJ, Mölker A, Hunink MGM. Diagnostic performance of stress myocardial perfusion imaging for coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis. *Eur Radiol* 2012. doi 10.1007/s00330-012-2434-1.
- Nandalur KR, Dwamena BA, Choudhri AF, Nandalur MR, Carlos RC. Diagnostic performance of stress cardiac magnetic resonance imaging in the detection of coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 2007; 50: 1343–53.
- Schwittler J, Wacker CM, Wilke N, et al for the MR-IMPACT Investigators. MR-IMPACT II: Magnetic resonance imaging for myocardial perfusion assessment in coronary artery disease trial: perfusion-cardiac magnetic resonance vs. single-photon emission computed tomography for the detection of coronary artery disease: a comparative multicentre, multi-vendor trial. *Eur Heart J* 2012. [Epub ahead of print].
- Greenwood JP, Maredia N, Younger JF, et al. Cardiovascular magnetic resonance imaging and single-photon emission computed tomography for diagnosis of coronary heart disease (CE-MARK): a prospective trial. *Lancet* 2012; 379: 453–60.
- Watkins S, Ross McGeoch, Jonathan Lyne, et al. Validation of magnetic resonance myocardial perfusion imaging with fractional flow reserve for the detection of significant coronary heart disease. *Circulation* 2009; 120: 2207–13.
- Chung SY, Lee KY, Chun EJ, et al. Comparison of stress perfusion MRI and SPECT for detection of myocardial ischemia in patients with angiographically proven three-vessel coronary artery disease. *AJR* 2010; 195: 356–62.
- Klug G, Mayr A, Schenk S, et al. Prognostic value at 5 years of microvascular obstruction after acute myocardial infarction assessed by cardiovascular magnetic resonance. *J Cardiovasc Magn Reson* 2012; 14: 46.
- Grothues F, Smith GC, Moon JC, Bellenger NG, Collins P, Klein HU, Pennell DJ. Comparison of interstudy reproducibility of cardiovascular magnetic resonance with two-dimensional echocardiography in normal subjects and in patients with heart failure or left ventricular hypertrophy. *Am J Cardiol* 2002; 90: 29–34.
- Cerqueira MD, Weissman NJ, Dilsizian V, Jacobs AK, Kaul S, Laskey WK, Pennell DJ, Rumberger JA, Ryan T, Verani MS. Standardized myocardial segmentation and nomenclature for tomographic imaging of the heart: a statement for healthcare professionals from the Cardiac Imaging Committee of the Council on Clinical Cardiology of the American Heart Association. *Circulation* 2002; 105: 539–42.
- Allman KC, Shaw LJ, Hachamovitch R, Udelson JE. Myocardial viability testing and impact of revascularization on prognosis in patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction: a meta-analysis. *J Am Coll Cardiol* 2002; 39: 1151–8.
- Kim RJ, Wu E, Rafael A, Chen EL, Parker MA, Simonetti O, Klocke FJ, Bonow RO, Judd RM. The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to identify reversible myocardial dysfunction. *N Engl J Med* 2000; 343: 1445–53.
- Wellnhofer E, Olariu A, Klein C, Gräfe M, Wahl A, Fleck E, Nagel E. Magnetic resonance low-dose dobutamine test is superior to scar quantification for the prediction of functional recovery. *Circulation* 2004; 109: 2172–4.
- Kim RJ, Manning WJ. Viability assessment by delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance imaging: will low-dose dobutamine dull the shine? *Circulation* 2004; 109: 2476–9.
- White JA, Yee R, Yuan X, Krahn A, Skanes A, Parker M, Klein G, Drangova M. Delayed enhancement magnetic resonance imaging predicts response to cardiac resynchronization therapy in patients with intraventricular dyssynchrony. *J Am Coll Cardiol* 2006; 48: 1953–60.
- Chaili S, Foley P, Muhyaldeen S, Patel K, Yousef Z, Smith R, Frenneaux M, Leyva F. Late gadolinium enhancement-cardiovascular magnetic resonance as a predictor of response to cardiac resynchronization therapy in patients with ischaemic cardiomyopathy. *Europace* 2007; 9: 1031–7.

19. Maron BJ, Towbin JA, Thiene G, Antzelevitch C, Corrado D, Arnett D, Moss AJ, Seidman CE, Young JB. Contemporary definitions and classification of the cardiomyopathies. A scientific statement of the American Heart Association. *Circulation* 2006; 113: 1807–16.
20. Karamitsos TD, Francis JM, Myerson S. The role of cardiovascular magnetic resonance imaging in heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 1407–24.
21. Nathan M, Chia YL, Croisille P, Bluemke D, Lima JAC. Assessment of myocardial fibrosis with cardiovascular magnetic resonance. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 891–903.
22. Leyva F. Cardiac resynchronization therapy guided by cardiovascular magnetic resonance. *J Cardiovasc Magn Reson* 2010; 12: 64–86.
23. Leyva F, Foley PW, Chalil S, Ratib K, Smith RE, Prinzen F, Auricchio A. Cardiac resynchronization therapy guided by late gadolinium-enhancement cardiovascular magnetic resonance. *J Cardiovasc Magn Reson* 2011; 13: 29–38.
24. Pankuweit S, Richter A, Ruppert V, Maisch B. Classification of cardiomyopathies and indication for endomyocardial biopsy revisited. *Herz* 2009; 34: 55–62.
25. Elliott P, Andersson B, Arbustini E, et al. Classification of the cardiomyopathies: a position statement from the European society of cardiology working group on myocardial and pericardial diseases. *Eur Heart J* 2008; 29: 270–6.
26. McCrohon JA, Moon JC, Prasad SK, McKenna WJ, Lorenz CH, Coats AJ, Pennell DJ. Differentiation of heart failure related to dilated cardiomyopathy and coronary artery disease using gadolinium enhanced cardiovascular magnetic resonance. *Circulation* 2003; 108: 54–9.
27. Gersh BJ, Maron BJ, Bonow RO, Dearani JA, Fifer MA, Link MS, Naidu SS, Nishimura RA, Ommen SR, Rakowski H. 2011 ACCF/AHA guideline for the diagnosis and treatment of hypertrophic cardiomyopathy: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines developed in collaboration with the American Association for Thoracic Surgery, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. *J Am Coll Cardiol* 2011; 58: 2703–38.
28. White JA, Fine NM, Gula L, Yee R, Skanes A, Klein G, Leong-Sit P, Warren H, Thompson T, Drangova M. Utility of cardiovascular magnetic resonance in identifying substrate for malignant ventricular arrhythmias. *Circ Cardiovasc Imaging* 2012; 5: 12–20.
29. Jenni R, Oechslin E, Schneider J, Attenhofer JC, Kaufmann PA. Echocardiographic and pathoanatomical characteristics of isolated left ventricular noncompaction: a step towards classification as a distinct cardiomyopathy. *Heart* 2001; 86: 666–71.
30. Petersen SE, Selvanayagam JB, Wiesmann F. Left ventricular non-compaction: insights from cardiovascular magnetic resonance imaging. *J Am Coll Cardiol* 2005; 46: 101–5.
31. Dursun M, Agayev Ayaz, Ertugrul T, Onur I, Oflaz H, Yekeler E. MR imaging features of ventricular noncompaction: emphasis on distribution and pattern of fibrosis. *Eur J Radiol* 2010; 74: 147–51.
32. Fernández-Pérez GC, Anguilar-Arjona JA, Tardáguila de la Fuente G, Samartín M, Ghioidi A, Arias JC, Sánchez-González J. Takotsubo cardiomyopathy: assessment with cardiac MRI. *AJR* 2010; 195: W139–W145.
33. Sharkey SW, Windenburg DC, Lesser JR, et al. Natural history and expansive clinical profile of stress (Tako-Tsubo) cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2010; 55: 333–41.
34. Masui T, Finck S, Higgins CB. Constrictive pericarditis and restrictive cardiomyopathy: evaluation with MR imaging. *Radiology* 1992; 182: 369–73.
35. Mahrholdt H, Wagner A, Judd RM, et al. Delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance assessment of non-ischaemic cardiomyopathies. *Eur Heart J* 2005; 26: 1461–74.
36. Cheng H, Zhao S, Jiang S, Lu M, Yan C, Ling J, Zhang Y, Liu Q, Ma N, Yin G, Jerecic R, He Z. The relative atrial volume ratio and late gadolinium enhancement provide additive information to differentiate constrictive pericarditis from restrictive cardiomyopathy. *J Cardiovasc Magn Reson* 2011; 13: 15–23.
37. Friedrich MG, Sechtem U, Schulz-Menger J, et al. Cardiovascular magnetic resonance in myocarditis: a JACC white paper. *J Am Coll Cardiol* 2009; 53: 1475–87.
38. Frank H, Globits S. Magnetic resonance imaging evaluation of myocardial and pericardial disease. *JMRI* 1999; 10: 617–26.
39. Laissy JP, Hyafil F, Juliard JM, Schouman-Claeys, Steg PG, Faraggi M. Differentiating acute myocardial infarction from myocarditis: diagnostic value of early- and delayed-perfusion cardiac MR imaging. *Radiology* 2005; 237: 75–82.
40. Goitein O, Matetzky S, Beinart R, Di Segni E, Hod H, Bentancur A, Konen E. Acute myocarditis: non-invasive evaluation with cardiac MRI and transthoracic echocardiography. *AJR* 2008; 192: 254–8.
41. Gahide G, Bertrand D, Roubille F, Tron C, Skaik S, Piot C, Leclercq F, Cribier A, Verneht H, Dacher JN. MR delayed enhancement imaging findings in suspected acute myocarditis. *Eur Radiol* 2010; 20: 65–72.
42. Gutberlet M, Spors B, Thoma T, Bertram H, Denecke T, Felix R, Noutias M, Schultheiss HP, Kühl U. Suspected chronic myocarditis at cardiac CT: diagnostic accuracy and association with immunohistological detected inflammation and viral persistence. *Radiology* 2008; 246: 401–9.
43. Yilmaz A, Kindermann I, Kindermann M, Mahfoud F, Ukena C, Athanasiadis A, Hill S, Mahrholdt H, Voehringer M, Schiebler M, Klingel K, Kandolf R, Böhm M, Sechtem U. Comparative evaluation of left and right ventricular endomyocardial biopsy: differences in complication rate and diagnostic performance. *Circulation* 2010; 122: 900–9.
44. Mahrholdt H, Goedecke C, Wagner A, Meinhardt G, Athanasiadis A, Vogelsberg H, Fritz P, Klingel K, Kandolf R, Sechtem U. Cardiovascular magnetic resonance assessment of human myocarditis: a comparison to histology and molecular pathology. *Circulation* 2004; 109: 1250–8.
45. Keller D, Osswald S, Bremerich J. Arrhythmogenic rightventricular dysplasia: diagnostic and prognostic value of cardiac MRI in relation to arrhythmia free survival. *Int J Card Imaging* 2003; 19: 537–43.
46. Kayser HW, van der Wall EE, Sivananthan MU, Plein S, Bloomer TN, de Roos A. Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dysplasia: a review. *Radiographics* 2002; 22: 639–48.
47. Marcus FI, Zareba W, Calkins H, et al. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia clinical presentation and diagnostic evaluation: results from the North American Multidisciplinary Study. *Heart Rhythm* 2009; 6: 984–92.
48. Bluemke DA, Krupinski EA, Ovitt T, et al. MRI Imaging of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: morphological findings and intraobserver reliability. *Cardiology* 2003; 99: 153–62.
49. Marcus FI, McKenna WJ, Sherrill D, et al. Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia: proposed modification of the task force criteria. *Circulation* 2010; 121: 1533–41.
50. Globits S, Kreiner G, Frank H, Heinz G, Klaar U, Frey B, Gössinger H. Significance of morphological abnormalities detected by MRI in patients undergoing successful ablation of right ventricular outflow tract tachycardia. *Circulation* 1997; 96: 2633–40.
51. Wang ZJ, Reddy GP, Gotway MB, Yeh BM, Hettis SW, Higgins CB. CT and MR imaging of pericardial disease. *Radiographics* 2003; 23: S167–80.
52. Masui T, Finck S, Higgins CB. Constrictive pericarditis and restrictive cardiomyopathy: evaluation with MR imaging. *Radiology* 1992; 182: 369–73.
53. Sechtem U, Tscholakoff D, Higgins CB. MRI of the abnormal pericardium. *Am J Roentgenol* 1986; 147: 239–44.
54. Lam KY, Dickens P, Chan AC. Tumors of the heart. A 20-year experience with a review of 12,485 consecutive autopsies. *Arch Pathol Lab Med* 1993; 117: 1027–31.
55. Hoffmann U, Globits S, Schima W, Loewig C, Puig S, Oberhuber G, Frank H. Usefulness of magnetic resonance imaging of cardiac and paracardiac masses. *Am J Cardiol* 2003; 92: 890–5.
56. Aurigemma G, Reichek N, Schiebler M, Axel L. Evaluation of aortic regurgitation by cardiac cine MRI: planar analysis and comparison to Doppler echocardiography. *Cardiology* 1991; 78: 340–7.
57. Wagner S, Auffermann W, Buser P, Lim TH, Kircher B, Pflugfelder P, Higgins CB. Diagnostic accuracy and estimation of the severity of valvular regurgitation from the signal void on cine magnetic resonance imaging. *Am Heart J* 1989; 118: 760–7.
58. Glockner JF, Johnston DL, McGee KP. Evaluation of cardiac valvular disease with MR imaging: Qualitative and quantitative techniques. *Radiographics* 2003; 23: e9.
59. Nishimura F. Oblique cine MRI for the evaluation of aortic regurgitation: comparison with cineangiography. *Clin Cardiol* 1992; 15: 73–8.
60. Globits S, Frank F, Mayr H, et al. Quantitative assessment of aortic regurgitation by magnetic resonance imaging. *Eur Heart J* 1992; 13: 78–83.
61. Sondergaard L, Lindvig K, Hildebrandt P, et al. Quantification of aortic regurgitation by magnetic resonance velocity mapping. *Am Heart J* 1993; 125: 1081–90.
62. Fujita N, Chazouilleres AF, Hartiala JJ, et al. Quantification of mitral regurgitation by velocity-encoded cine nuclear magnetic resonance imaging. *J Am Coll Cardiol* 1994; 23: 951–8.
63. Morris MF, Maleszewski JJ, Suri RM, et al. CT and MR imaging of the mitral valve: radiologic-pathologic correlation. *Radiographics* 2010; 30: 603–20.
64. Didier D. Assessment of valve disease. Qualitative and quantitative. *Magn Reson Imaging Clin N Am* 2003; 11: 115–34.
65. Health Canada. Congenital Anomalies in Canada – A Perinatal Health Report, 2002. Minister of Public Works and Government Services Canada. www.phac-aspc.gc.ca/ccasn-rcsac/2002_pres-eng.php
66. Marelli AJ, Mackie AS, Ionescu-Ittu R, Rahme E, Pilote L. Congenital heart disease in the general population: Changing prevalence and age distribution. *Circulation* 2007; 115: 163–72.
67. Freeman, LJ. Grown up congenital heart (GUCH) disease: a half century of change. *Clin Med* 2008; 8: 169–71.
68. Kilner PJ, Geva T, Kaemmerer H, Trindade PT, Schwittler J, Webb GD. Recommendations for cardiovascular magnetic resonance in adults with congenital heart disease from the respective working groups of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2010; 3: 794–805.
69. Kersting-Sommerhoff BA, Diethelm L, Stanger P, Dery R, Higashino SM, Higgins SS, Higgins CB. Evaluation of complex congenital ventricular anomalies with magnetic resonance imaging. *Am Heart J* 1990; 120: 133–42.
70. Hundley WG, Li HF, Lange RA, et al. Assessment of left-to-right intracardiac shunting by velocity-encoded, phase-difference magnetic resonance imaging. A comparison with oximetric and indicator dilution techniques. *Circulation* 1995; 91: 2955–60.
71. Rebergen SA, Chin JG, Ottenkamp J, van der Wall EE, de Roos A. Pulmonary regurgitation in the late postoperative follow-up of tetralogy of Fallot. Volumetric quantitation by nuclear magnetic resonance velocity mapping. *Circulation* 1993; 92: 1123–32.
72. Sommer T, Fehske W, Holznecht N, et al. Aortic dissection: a comparative study of diagnosis with spiral CT, multiplanar transesophageal echocardiography, and MR imaging. *Radiology* 1996; 199: 347–52.
73. Fayad ZA, Nahar T, Fallon JT, et al. In vivo magnetic resonance evaluation of atherosclerotic plaques in the human thoracic aorta: a comparison with transesophageal echocardiography. *Circulation* 2000; 101: 2503–9.
74. Steffens JC, Bourne MW, Sakuma H, O'Sullivan M, Higgins CB. Quantification of collateral blood flow in coarctation of the aorta by velocity encoded cine magnetic resonance imaging. *Circulation* 1994; 90: 937–43.
75. Wieben O, Francois C, Reeder SB. Cardiac MRI of ischemic heart disease at 3 T: potential and challenges. *Eur J Radiol* 2008; 65: 15–28.
76. Oshinski JN, Delfino JG, Sharma P, Gharib AM, Pettigrew RI. Cardiovascular magnetic resonance at 3.0 T: current state of the art. *J Cardiovasc Magn Reson* 2010; 12: 55–68.
77. Schär M, Kozek S, Fischer SE, Boesiger P. Cardiac SSFP imaging at 3 Tesla. *Magn Reson Med* 2004; 51: 799–806.
78. Greiser A, Weber O, Deshpande V, Müller E. Improved cardiac shimming in a clinical setting by multi-frame fieldmap acquisition and automatic ROI extension. *J Cardiovasc Magn Reson* 2007; 9: 239–40.
79. Wansapura J, Fleck R, Crotty E, Gottlieb W. Frequency scouting for cardiac imaging with SSFP at 3 Tesla. *Pediatr Radiol* 2006; 36: 1082–5.
80. Michael HJ, Nael K, Schoenberg SO, Laub G, Reiser MF, Finn JP, Ruehm SG. Analysis of cardiac function – comparison between 1.5 Tesla and 3.0 Tesla cardiac cine magnetic resonance imaging: preliminary experience. *Invest Radiol* 2006; 41: 133–40.
81. Hudsmith LE, Cheng AS, Tyler DJ, Shirodaria C, Lee J, Petersen SE, Francis JM, Clarke K, Robson MD, Neubauer S. Assessment of left atrial volumes at 1.5 Tesla and 3 Tesla using FLASH and SSFP cine imaging. *J Cardiovasc Magn Reson* 2007; 9: 673–9.
82. Maroules CD, McCall R, Khera A, Peshock RM. Interstudy reproducibility of SSFP cine magnetic resonance: impact of magnetic field strength and parallel imaging. *J Magn Reson Imaging* 2008; 27: 1139–45.
83. Cheng AS, Pegg TJ, Karamitsos TD, et al. Cardiovascular magnetic resonance perfusion imaging at 3-Tesla for the detection of coronary artery disease: a comparison with 1.5-Tesla. *J Am Coll Cardiol* 2007; 49: 2440–9.
84. Hamon M, Fau G, Née G, Ehtisham J, Morcello R, Hamon M. Meta-analysis of the diag-

nostic performance of stress perfusion cardiovascular magnetic resonance for detection of coronary artery disease. *J Cardiovasc Magn Reson* 2010; 12: 29–39.

85. Levine GN, Gomes AS, Arai AE, Bluemke DA, Flamm SD, Kanal E, Manning WJ, Martin ET, Smith JM, Wilke N, Shellock FS; American Heart Association Committee on Diagnostic and Interventional Cardiac Catheterization; American Heart Association Council on Clinical Cardiology; American Heart Association Council on Cardiovascular Radiology and Intervention. Safety of magnetic resonance

imaging in patients with cardiovascular devices: an American Heart Association scientific statement from the Committee on Diagnostic and Interventional Cardiac Catheterization, Council on Clinical Cardiology, and the Council on Cardiovascular Radiology and Intervention: endorsed by the American College of Cardiology Foundation, the North American Society for Cardiac Imaging, and the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. *Circulation* 2007; 116: 2878–91.

86. Strach K, Naehle CP, Mühlsteffen A, et al. Low field magnetic resonance imaging: in-

creased safety for pacemaker patients? *Europace* 2009; 12: 952–60.

87. Naehle CP, Kreuz J, Strach K, et al. Safety, feasibility, and diagnostic value of cardiac magnetic resonance imaging in patients with cardiac pacemakers and implantable cardioverters/defibrillators at 1.5T. *Am Heart J* 2011; 161: 1096–105.

88. Rouguin A, Schwitter Juerg, Vahlhaus C, Lombardi M, Brugada J, Vardas P, Auricchio A, Prori S, Sommer T. Magnetic resonance imaging in individuals with cardiovascular implant-

able electronic devices. *Europace* 2008; 10: 336–46.

89. Sutton R, Kanal E, Wilkoff BL, Bello D, Luechinger R, Jenniskens I, Hull M, Sommer T. Safety of magnetic resonance imaging of patients with a new Medtronic EnRhythm MRISureScan pacing system: clinical study design. *Trials* 2008; 9: 68–76.

90. Shellock FG. Reference Manual for Magnetic Resonance Safety, Implants, and Devices. Biomedical Research Publishing Group, Los Angeles, 2011.

Mitteilungen aus der Redaktion

Besuchen Sie unsere Rubrik

☒ Medizintechnik-Produkte



Neues CRT-D Implantat
Intica 7 HF-T QP von Biotronik



Artis pheno
Siemens Healthcare Diagnostics GmbH



Philips Azurion:
Innovative Bildgebungslösung

Aspirator 3
Labotect GmbH



InControl 1050
Labotect GmbH

e-Journal-Abo

Beziehen Sie die elektronischen Ausgaben dieser Zeitschrift hier.

Die Lieferung umfasst 4–5 Ausgaben pro Jahr zzgl. allfälliger Sonderhefte.

Unsere e-Journale stehen als PDF-Datei zur Verfügung und sind auf den meisten der marktüblichen e-Book-Readern, Tablets sowie auf iPad funktionsfähig.

☒ Bestellung e-Journal-Abo

Haftungsausschluss

Die in unseren Webseiten publizierten Informationen richten sich **ausschließlich an geprüfte und autorisierte medizinische Berufsgruppen** und entbinden nicht von der ärztlichen Sorgfaltspflicht sowie von einer ausführlichen Patientenaufklärung über therapeutische Optionen und deren Wirkungen bzw. Nebenwirkungen. Die entsprechenden Angaben werden von den Autoren mit der größten Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. Die angegebenen Dosierungen sind im Einzelfall anhand der Fachinformationen zu überprüfen. Weder die Autoren, noch die tragenden Gesellschaften noch der Verlag übernehmen irgendwelche Haftungsansprüche.

Bitte beachten Sie auch diese Seiten:

Impressum

Disclaimers & Copyright

Datenschutzerklärung