

Journal für Kardiologie

Austrian Journal of Cardiology

Österreichische Zeitschrift für Herz-Kreislauserkrankungen

Echokardiographie-Bilder: Cor triatritum sinister

Journal für Kardiologie - Austrian

Journal of Cardiology 2001; 8 (3)

Homepage:

www.kup.at/kardiologie

Online-Datenbank
mit Autoren-
und Stichwortsuche



Offizielles
Partnerjournal der ÖKG



Member of the ESC-Editor's Club



Offizielles Organ des
Österreichischen Herzfonds



ACVC
Association for
Acute CardioVascular Care

In Kooperation
mit der ACVC

Indexed in ESCI
part of Web of Science

Indexed in EMBASE

Krause & Pachernegg GmbH • Verlag für Medizin und Wirtschaft • A-3003 Gablitz

P.b.b. 02Z031105M,

Verlagsort: 3003 Gablitz, Linzerstraße 177A/21

Preis: EUR 10,-

Veranstungskalender

Hybrid-Veranstaltungen der Herausgeber des **Journals für Kardiologie**

Finden Sie alle laufend aktualisierten Termine
auf einem Blick unter

www.kup.at/images/ads/kongress.pdf

ECHOKARDIOGRAPHIE-BILDER

Aus dem Echokardiographie-Labor der Kardiologischen Abteilung,
Universitätsklinik für Innere Medizin II

ECHOKARDIO-
GRAPHIE-
BILDER

COR TRIARIATUM SINISTER

Vorgeschichte

60jähriger Mann mit Vorhofflimmern und geringer Atemnot. Im Thoraxröntgen fand sich ein vergrößerter Herzschatten ohne Stauungszeichen.

Echokardiographie


Es findet sich eine partielle Septierung des linken Vorhofs, wobei die Öffnung zwischen dem klappennahen und dem klappenfernen Anteil des linken Vorhofs relativ groß ist. Auch dopplersonographisch fand sich keine Obstruktion. Funktionell besteht somit keine Wirksamkeit des Herzfehlers.

Das Cor triatriatum sinister ist eine seltene kongenitale Fehlbildung, welche oft gemeinsam mit anderen Defekten (z. B. fehlmündenden Lungenvenen) auftritt. Die Erkrankung ist durch eine (partielle) Septierung des linken Vorhofs gekennzeichnet, die den Vorhof typischerweise oberhalb des linken Herzhohls und der Fossa ovalis in zwei „Kammern“ teilt. Die Größe der Öffnung innerhalb der Membran bestimmt das Ausmaß der hämodynamischen Wirksamkeit. Falls eine Wirksamkeit vorliegt, ähnelt das klinische Erscheinungsbild jenem der Mitralkstenose.

Korrespondenzadresse:

Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Binder
Echokardiographie-Labor der
Kardiologischen Abteilung,
Universitätsklinik für Innere Medizin II,
Allgemeines Krankenhaus Wien
A-1090 Wien, Währinger Gürtel 18–20

Abbildung 1: Transthorakale Echokardiographie mit Vier-Kammerblick (oben) und apikale lange Achse (unten). Septierung des linken Vorhofs im Sinne eines Cor triatriatum sinister (Ao = Aorta, LA = linkes Atrium, LV = linker Ventrikel, RA = rechtes Atrium, RV = rechter Ventrikel)



Mitteilungen aus der Redaktion

Besuchen Sie unsere Rubrik

☒ Medizintechnik-Produkte



Neues CRT-D Implantat
Intica 7 HF-T QP von Biotronik



Artis pheno
Siemens Healthcare Diagnostics GmbH



Philips Azurion:
Innovative Bildgebungslösung

Aspirator 3
Labotect GmbH



InControl 1050
Labotect GmbH

e-Journal-Abo

Beziehen Sie die elektronischen Ausgaben dieser Zeitschrift hier.

Die Lieferung umfasst 4–5 Ausgaben pro Jahr zzgl. allfälliger Sonderhefte.

Unsere e-Journale stehen als PDF-Datei zur Verfügung und sind auf den meisten der marktüblichen e-Book-Readern, Tablets sowie auf iPad funktionsfähig.

☒ Bestellung e-Journal-Abo

Haftungsausschluss

Die in unseren Webseiten publizierten Informationen richten sich **ausschließlich an geprüfte und autorisierte medizinische Berufsgruppen** und entbinden nicht von der ärztlichen Sorgfaltspflicht sowie von einer ausführlichen Patientenaufklärung über therapeutische Optionen und deren Wirkungen bzw. Nebenwirkungen. Die entsprechenden Angaben werden von den Autoren mit der größten Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. Die angegebenen Dosierungen sind im Einzelfall anhand der Fachinformationen zu überprüfen. Weder die Autoren, noch die tragenden Gesellschaften noch der Verlag übernehmen irgendwelche Haftungsansprüche.

Bitte beachten Sie auch diese Seiten:

[Impressum](#)

[Disclaimers & Copyright](#)

[Datenschutzerklärung](#)